



¡AYUDA A TU ANIMAL A RECUPERARSE!

durante los próximos siete días

mira un
video aqui



NO LAMER

Lamer o morder la incisión puede provocar una infección.




INSPECCIONAR

Lo que observamos hoy es normal. Revise dos veces al día para identificar enrojecimiento, hinchazón o secreción.

MANTENLO SECO

El agua influye en el adhesivo quirúrgico y puede causar que la incisión se abra.




ANIMALES DIVIDIDOS



Mantenga a las hembras separadas de los machos no castrados.

HOMBRES



Las incisiones permanecen abiertas y es habitual observar hinchazón y secreción roja durante varios días.

LIMITAR LA ACTIVIDAD



El descanso interno proporciona al tejido el tiempo necesario para recuperarse y contribuye a que la incisión se mantenga cerrada.

¡NO CORRER, SALTAR NI JUGAR!




DIETA BLANDA


Sin comida chatarra, restos de la mesa, leche & golosinas extra. La anestesia puede provocarles malestar en el estómago.

NO MEDICACIÓN HUMANA

¡Puede ser fatal! A tu mascota ya se le ha administrado un analgésico de larga duración.



Si siguen estas indicaciones en su totalidad, haremos todo lo posible para atender en nuestra clínica, a un costo mínimo, cualquier complicación postoperatoria que derive directamente de la cirugía. Su veterinario habitual debe encargarse de enfermedades o consultas que no sean consecuencia directa de la cirugía. Estamos disponibles fuera del horario de atención, pero no podemos estar disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Su mascota es su responsabilidad; por favor, no evite el tratamiento de emergencia, si es necesario, por no poder comunicarse con nosotros.



Comuníquese con nosotros de inmediato si observa: encías pálidas, depresión, dificultades para caminar, pérdida de apetito o reducción en la ingesta de agua, vómitos, diarrea, secreción excesiva o sangrado de la incisión, problemas para orinar o defecar; dificultad para respirar.